

Luisteren naar vrouwen

Trudy Klomp MSc
Projectleider / verloskundige



Berichtgeving in de media



Stem van vrouwen

- Verwachtingen, wensen, angsten
- Ervaringen
- Belangrijk voor kwaliteit van zorg



Vorbereiding op de bevalling

Vorbereiding >34wkn bevalling & kraam		
Zwangerschapscursus	16% Anders 15% Yoga 13% Zwangerschapsgym	
Borstvoeding	83%	
Kraamzorg aanmelding	99%	
Geplande plaats van baring	39% Poliklinisch 38% Thuis 12% Ziekenhuis (mi) 10% Nog niet beslist 1% Elders	



Angstgevoelens tijdens zwangerschap

Meeste angst voor:	Meer bij:
Bevalling(pijn)	Alloctonen, primi & lager opgeleiden
Ziek/zwak kind	Autoctonen, primi & hoger opgeleiden
Gewichtstoename	Alloctonen & primi
Niet oude figuur terug	Alloctonen & lager opgeleiden



Afspraken over bevalling en pijn

Voorkeur pijnbestrijding besproken?

Ja	Nee	Nog niet
53%	24%	24%

Voorkeur vastgelegd?

Ja	Nee	Nog niet
39%	41%	20%

Geboorteplan?

Ja	Nee	-
16%	84%	-




Voorkeur pijnbestrijding

Voorkeur >34wkn (CVL2)	Ja n=1027 %	Nee n=2369 %
	30	70

Voorkeur Medicinaal	geen behandeling %	ruggenprik %	infuus met een pompje %	injectie met pijnstilling %
N=1025	36	32	22	11

Voorkeur <u>zonder</u> medic.	warm water %	rug- massage %	anders %	geen behandeling %	TENS %	drukpunt- massage %	acupunt. %
N=1026	55	18	15	14	6	2	<1

Verwachte en ervaren baringspijn



Omgaan met pijn

Gebruik pijnstilling / pijnbeheersing

Medicinaal

27%

n=1031

- 56% ruggenprik
- 28% injectie
- 23% infuus met pompje



85% tevreden

Niet-medicinaal

12%


n=463

- 62% warm water
- 37% rugmassage
- 9% drukpuntmassage




Voorkeur overeenkomend met gebruikte methode?

Groep 1



Groep 2



Kans 1.5 tot 3.5 keer zo groot

In welke houding bevallen vrouwen?

- **Liggend baren 85%**
- **Niet liggend baren 15%**
 - ZH 7%, Thuis 22%
- **Niet kunnen bewegen 45%**



Hoe is de bevalling verlopen?

Bevalling	Deliver 2009-2010 % N=6026	PRN 2008 % N=174376
Spontaan zonder ingrepen	58,3	58.8
Ingeknipt	23,7	-
Ingeleid	17	15,5
Kunstmatig (met infuus) versterkt	22	19.5
Kunstverlossing	11,1	10
Keizersnede geworden	8.5	8.9
Geplande keizersnede	4.1	6.5

Bevallen in aanwezigheid van...

partner	98%
'eigen' vk	59%
gyn/arts-ass.	43%
klin.vk	27%
(schoon)ouder	8%
vriendin	2%



Oordeel zorg

Totaaloordeel 8.8


Baring & kraam

>95% In vertrouwde handen
Serieus genomen
Voldoende tijd




Rapportcijfer verloskundige zorg baring

- Bevalling totaal oordeel zorg



Rapportcijfer kraamzorg

- Kraamperiode totaal oordeel kraamzorg



Wie is minder tevreden?

- Allochtonen
Minder tevreden bevalling en kraam (score<7)
- Allochtonen, primi & hoger opgeleiden
Meest ontevreden over de tijd



Gevoel van controle score: wie scoort hoog en wie laag?

Tijdens ontsluiting

minder bij allochtonen, primi
& lager opgeleiden


Tijdens baring

meer bij aanwezigheid eigen
verloskundige en thuis bevallen



Mortaliteit

- Deliver studie perinatale sterfte 0.5%
- NL perinatale sterfte 0.9%
- Risicogroepen:
 - laag opgeleid
 - niet-westerse nationaliteit
 - achterstandbuurt



Conclusies

Aanwezigheid

eigen verloskundige

Aandacht

voor het individu

Tijd

Voor de cliënt

Ervaringen

Rond de baring kunnen beter

**Bewegingsvrijheid, Niet-liggende houding,
Angstgevoelens, Niet-medicinale pijnbestrijding**